

BIJLAGE 4: Weergave van optimale en suboptimale inventarisatieperiode per biotoopgroep

| Biotooptype | jan | feb | maart | april | mei | juni | juli | aug | sep | okt | nov | dec |
|-----------------------------|-----|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| Watervegetaties | | | | | Suboptimaal | Optimaal | Optimaal | Optimaal | Suboptimaal | | | |
| Moerasvegetaties | | | | | Suboptimaal | Optimaal | Optimaal | Suboptimaal | | | | |
| Graasweide | | | | Suboptimaal | Optimaal | Optimaal | Optimaal | Suboptimaal | | | | |
| Hooilanden | | | | Suboptimaal | Optimaal | Maaipiek | Suboptimaal | Suboptimaal | Suboptimaal | Suboptimaal | | |
| Vochtige schraal-graslanden | | | | | Suboptimaal | Optimaal | Optimaal | Optimaal | Suboptimaal | | | |
| Droge schraal-graslanden | | | | | | Suboptimaal | Optimaal | Optimaal | Optimaal | Suboptimaal | | |
| Zilte vegetaties | | | | | | Suboptimaal | Optimaal | Optimaal | Optimaal | Suboptimaal | | |
| Loofbossen voedselrijk | | | Suboptimaal | Optimaal | Optimaal | Optimaal | Suboptimaal | Suboptimaal | | | | |
| Loofbossen voedselarm | | | | Suboptimaal | Optimaal | Optimaal | Optimaal | Optimaal | Optimaal | Suboptimaal | | |
| Naaldbossen | | | | | Suboptimaal | Optimaal | Optimaal | Optimaal | Optimaal | Suboptimaal | Suboptimaal | |
| Droge duinen | | | | Suboptimaal | Optimaal | Optimaal | Suboptimaal | Suboptimaal | Suboptimaal | Suboptimaal | | |
| Natte duinen | | | | Suboptimaal | Suboptimaal | Optimaal | Optimaal | Optimaal | Suboptimaal | Suboptimaal | Suboptimaal | |
| Akker-gemeenschappen | | | | | Suboptimaal | Optimaal | Optimaal | Optimaal | Suboptimaal | Suboptimaal | | |
| Heiden | | | | | | Suboptimaal | Optimaal | Optimaal | Optimaal | Suboptimaal | | |

