

weelderige klimopbomen, kruinen van sparren en zelfs sierconiferen. Alain maakt momenteel zo goed als uitsluitend gebruik van sparren om zich overdag schuil te houden. In het territorium van Eufrasie zijn nauwelijks sparren noch klimopbomen aanwezig, maar zij maakt gebruik van bramen- en andere dichte struwelen, ruigtes, takkenhopen en boomholtes. Dergelijke dekkingbiedende structuren dienen verspreid over een territorium aanwezig te zijn, boommarters gaan immers (net zoals bunnings en steenmarters) bij voorkeur rusten daar waar hun voedseltocht beëindigd werd, zodoende dienen ze niet telkens terug te keren.



Klimopbomen in gebruik als dagrustplaats (foto's INBO)

Nieuwe boomarterwaarneming in Overmere-Berlare (Oost-Vlaanderen)

In 2000 en 2001 deed marternetwerkmedewerker Georges Vervliet enkele mooie waarnemingen van een boomarterter op klaarlichte dag in de bossen van Overmere (Berlare). Daarnaast zagen enkele vissers 's morgens vroeg een marter met een gele tot 'rosse' keelvlak. Nadien bleef het er lange tijd stil op boomartertergebied. De vondst van een jong (dispenserend) boomartertermannetje op 18 maart 2010 in het nabije Kalken bracht deze waarnemingen opnieuw onder de aandacht waardoor we besloten om in de zomer en herfst van dat jaar fotovallen te installeren in de bossen van Berlare. Helaas werden toen geen boomarterters gefotografeerd. Toch hebben we de mogelijkheid dat boomarterters zich minstens onregelmatig voortplanten in het gebied steeds als plausibel beschouwd. Het gebied ligt tenslotte slechts op een 15-tal km in vogelvlucht van Sinaai, waarvan we ondertussen weten dat er jaarlijks boomarterters geboren worden. Na 2001 bleef het geruime tijd stil, tot Georges Vervliet op 29 juli van dit jaar opnieuw een prachtwaarneming van een boomarterter deed. De boomarterter werd in de namiddag liggend op een boomstam gezien, spiedend naar de konijnenjongen die in de buurt rondliepen. Mogelijk kan een nieuwe fotovalsessie meer informatie opleveren...