

Das ingezameld in Sint-Pieters-Rode (Vlaams-Brabant) (Marternieuws 19)

In Sint-Pieters-Rode werd op 13 juli een dode das waargenomen door natuurarbeider Benjamin Cazier en vervolgens ingezameld door boswachter Frank Delbecque, die de eerste vaststellingen deed (cf. bijzonder inzamelprotocol Vlaams-Brabant, zie Marternieuws 15). Er waren geen verdachte omstandigheden.

Het vermoeden van een verkeersslachtoffer werd bevestigd via de autopsie: zowel de schedel, het bekken als de rechters- en linkerachterpoot waren gebroken, de organen compleet verhakeld. De das - een wijfje - woog 11,142 kg en was in goede conditie met onder meer vrij veel onderhuids vet. Te oordelen aan de grootte van de baarmoeder was dit alvast geen eerstejaarswijfje. Gezien de zeer beperkte tandslijtage komen we, gerefereerd ten opzichte van februari als geboortemaand, tot een dier van ca. anderhalf jaar oud: een klassieke disperser. Op de stuit en de hals waren geen sporen van bijtonden te vinden, geen aanwijzingen dus voor sociale interacties kort voor de dood, wat laat veronderstellen dat de dispersie al een tijd aan de gang kan zijn geweest en het dier dus best mogelijk al een ruime afstand had afgelegd. Kort voor haar dood had dit jonge wijfje nog een muizennest gevonden: in de maag bevonden zich restanten van één volwassen muis en één nestjong.

Autopsieverlag van de wasbeerhond uit Tielt-Winge (Vlaams-Brabant) (Marternieuws 19)

In Marternieuws 16 (oktober 2014) berichtten we over twee dode wasbeerhonden die op korte tijd ingezameld werden: één op 5 augustus 2014 in Vorselaar (Antwerpen) en één op 28 september 2014 in Tielt-Winge. Voor het autopsieverlag van het exemplaar uit Vorselaar verwijzen we naar Marternieuws 16. Het dier uit Tielt-Winge lag pas deze zomer op onze autopsietafel.

Over de wasbeerhond uit Tielt-Winge valt helaas niet zo veel te vertellen. Het dier was platgereden, en in ver gevorderde staat van ontbinding. De schedel was volledig verbrijzeld en slechts enkele tanden konden worden teruggevonden. Van ingewanden was al lang geen sprake meer, honderden volgroeide vleesmaden waren de laatste restjes aan het verorberen op het moment van inzamelen. Veel dank aan Guy Lorent die het kadaver in deze toestand heeft ingezameld want nu hebben we toch minstens een DNA-staal. Ook het geslacht en de leeftijd konden we nog achterhalen: een wijfje, op basis van tandslijtage geen eerstejaarsdier.

Jos Goethuys meldde ons nog de waarneming van een wasbeerhond in het Walenbos de voorbije maand juli. Het Walenbos bevindt zich niet zo ver van de vindplaats van het verkeersslachtoffer van vorig jaar. Met ook dassen die mogelijk in de streek aanwezig zijn (zie vorig item: das ingezameld in Sint-Pieters-Rode)

wordt het dus opletten geblazen bij waarnemingen van dieren met een grijze, ruige vacht... Zo werd er onlangs nog op een andere locatie (de A13 in Kwaadmechelen, Limburg) een mogelijke das gemeld tegen de middenberm van een autostrade. Ondanks meerdere mensen die het kadaver gezien hebben kon de soort door niemand met zekerheid bepaald worden. Inzamelen was op deze gevaarlijke locatie niet aan de orde.

Wasberen ingezameld in Hoeilaart en Schepdaal (Vlaams Brabant) (Marternieuws 19)

Wasbeer ingezameld in Hoeilaart (Vlaams-Brabant)

Op 29 juli 2015 zamelde gepensioneerd boswachter René Oyen een dode wasbeer in langs de Ring rond Brussel, ter hoogte van de voormalige renbaan in het Zoniënwood in Groenendaal.

De autopsie wees uit dat het om een gezond maar duidelijk mager (gewicht 2,212 kg) jong ging. In de maag vonden we een grote grijze naaktslak (wellicht *Limax maximus*) en een wijngaardslak, in de darmtractus meerdere kersenpitten. Deze voedselitems duiden er op dat deze jonge wasbeer kennelijk in staat was natuurlijk voedsel te vinden en te nuttigen – maar dit sluit niet uit dat het om een uit gevangenschap ontsnapt dier kan gaan. Wasbeerjongen worden in de regel in april of begin mei geboren, en blijven minstens tot het najaar bij de moeder. Het spenen vindt zeer geleidelijk plaats, om pas vier maanden na de geboorte helemaal voltooid te worden. Deze jonge wasbeer zou dus in principe nog melk gedronken hebben bij de moeder, als aanvulling op het vaste voedsel. Was dit jong verzwakt geraakt doordat het moederdier mogelijk eerder verongelukte of gedood werd, dan wel omdat het jong ergens ontsnapte en aldus gescheiden raakte? Als het om een geboorte in het wild betrof, zouden er in principe meerdere jongen (worpen van 2 tot 6) in de buurt kunnen aanwezig zijn – maar verweesde jongen kunnen ook ver afdwalen van het moederlijk territorium...