

wordt het dus opletten geblazen bij waarnemingen van dieren met een grijze, ruige vacht... Zo werd er onlangs nog op een andere locatie (de A13 in Kwaadmechelen, Limburg) een mogelijke das gemeld tegen de middenberm van een autostrade. Ondanks meerdere mensen die het kadaver gezien hebben kon de soort door niemand met zekerheid bepaald worden. Inzamelen was op deze gevaarlijke locatie niet aan de orde.

Wasberen ingezameld in Hoeilaart en Schepdaal (Vlaams Brabant) (Marternieuws 19)

Wasbeer ingezameld in Hoeilaart (Vlaams-Brabant)

Op 29 juli 2015 zamelde gepensioneerd boswachter René Oyen een dode wasbeer in langs de Ring rond Brussel, ter hoogte van de voormalige renbaan in het Zoniënwoud in Groenendaal.

De autopsie wees uit dat het om een gezond maar duidelijk mager (gewicht 2,212 kg) jong ging. In de maag vonden we een grote grijze naaktslak (wellicht *Limax maximus*) en een wijngaardslak, in de darmtractus meerdere kersenpitten. Deze voedselitems duiden er op dat deze jonge wasbeer kennelijk in staat was natuurlijk voedsel te vinden en te nuttigen – maar dit sluit niet uit dat het om een uit gevangenschap ontsnapt dier kan gaan. Wasbeerjongen worden in de regel in april of begin mei geboren, en blijven minstens tot het najaar bij de moeder. Het spenen vindt zeer geleidelijk plaats, om pas vier maanden na de geboorte helemaal voltooid te worden. Deze jonge wasbeer zou dus in principe nog melk gedronken hebben bij de moeder, als aanvulling op het vaste voedsel. Was dit jong verzwakt geraakt doordat het moederdier mogelijk eerder verongelukte of gedood werd, dan wel omdat het jong ergens ontsnapte en aldus gescheiden raakte? Als het om een geboorte in het wild betrof, zouden er in principe meerdere jongen (worpen van 2 tot 6) in de buurt kunnen aanwezig zijn – maar verweesde jongen kunnen ook ver afdwalen van het moederlijk territorium...