



Inventarisatie kwetsbare zone Kruibeke

O. Ref. : **IN.A.2003.86**
Datum : *30 april 2003*
Auteurs: *Geert Spanoghe, Ralf Gyselings & Erika Van den Bergh*
Vragen naar : *Geert Spanoghe*
Aanvrager : *Afdeling Natuur*

Inventarisatie kwetsbare zone Kruibeke

Op vrijdag 28 maart 2003 werd het gedeelte van de zone waar de werken voor de aanleg van de Sigma-dijk gebeuren, dat door het MER als kwetsbare gebied werd aangeduid, geïnventariseerd op aanwezige broedvogels.

De resultaten van deze inventarisatieronde via de klassieke karteringsmethode worden hieronder weergegeven. Hierbij worden zingende vogels als zangpost (zp) genoteerd, waarnemingen van vogels als zichtwaarnemingen (zi). Deze laatste enkel als zij niet vlakbij een zangpost genoteerd werden, zodat ervan uitgegaan kan worden dat het een ander koppel/territorium betreft. Voor een betrouwbare broedvogelinventarisatie moeten meer dan 5 terreinbezoeken over het hele broedseizoen gemaakt worden. Gezien de vroege datum kan gesteld worden dat met dit één bezoek al een zeer goed beeld verkregen wordt van de aanwezige broedvogels. Van april tot mei komen hier nog enkele soorten bij. Er is echter geen reden om aan te nemen dat daar verschillende belangrijke soorten zouden tussenzitten. Daarvoor is het volledig omliggende deel van de Kruibeekse Polder momenteel door antropogene invloed te ondermaats als broedgebied. Van bijna alle soorten (exclusief de Nijlgans en mogelijks 1 koppel Wilde Eend) kan gesteld worden dat zij op deze datum nog niet met nesten zaten in het betreffende gebied.

<u>Soort</u>	<u>zp</u>	<u>zi</u>	<u>opmerking</u>
Tjiftjaf	5	0	
Winterkoning	4	2	
Roodborst	2	0	
Pimpelmees	1	1	
Koolmees	2	1	
Merel	1	0	
Heggemus	2	0	
Grote Bonte Specht	1	0	
Staatmees	0	1	
Spreeuw	2	0	
Houtduif	0	1	
Krakeend	-	2 koppel	
Wilde Eend	-	3 koppel	
Nijlgans	-	1 koppel	met nest
Meerkoet	-	1 koppel	
Waterhoen	-	1 koppel	

De aangetroffen soorten en dichtheden zijn normaal te noemen voor dergelijk gebied. Op zich eerder teleurstellend. Een directe oorzaak lijkt de manier waarop het gebied de laatste decennia antropogeen is aangetast: watervervuiling, inbrengen allerlei constructies zowel langs perceelsranden als langs oevers van poelen, sluikstorten,

Twee zangposten van Blauwborst (Bijlage I Vogelrichtlijn) bevonden zich ruim buiten de afgebakende perimeter (richting Schelde). Interessantere soorten als IJsvogel, Waterral, Zomertaling, Matkop, Kleine Bonte Specht ontbraken hier.

