




# Vissen in de Zeeschelde 2012-2021: vertellen ankerkuil en fuiken hetzelfde?




- 4 locaties van de grens tot Branst
- 3x/jaar: voorjaar, zomer, najaar
- Dominante soorten:
  - spiering (*Osmerus eperlanus*)
  - bot (*Platichthys flesus*)
  - brakwatergrondel (*Pomatoschistus microps*)
  - haring (*Clupea harengus*)




- Diversiteit**
- Dezelfde trends
  - Meer soorten met ankerkuil
  - Hogere Shannon diversiteit met fuiken



- Levenswijze**
- Omgekeerde verhouding
  - Tegengestelde trends



- Estuaries habitat gebruik**
- Trends in zelfde richting
  - Trends steiler met fuiken



	Ankerkuil	Fuiken
Campagne	2 kuilen 2x2u	2 fuiken 2x 24u
# vissen/jaar	1- 6 miljoen	8.000-26.000
kg vis/jaar	1.500 - 3.500	140 - 320
totaal # soorten 75	70	53
Seizoenale patronen	XXX	XX
Estuariene gradiënt	XXX	XXX
Soortselectiviteit		
zeldzame soorten	XXX	X
exoten	X	XX
<b>Kraamkamer:</b> zeebaars	XXX	X
haring en sprot	XXX	X
rietvoorn	--	XX
<b>Rekrutering:</b> fint	XX	--
spiering	XXX	XX
brasem	X	XXX
snoekbaars	XX	XXX
baars	--	XX

## Besluit

Resultaten geven geen tegenstrijdige maar aanvullende informatie over:

- Diversiteit
- Kraamkamerfunctie
- Rekrutering
- Seizoen effecten